Patientkort
Enwylma 120 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (denosumab biosimilar)

Detta påminnelsekort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till före och under behandlingen med injektioner av denosumab mot cancerrelaterade tillstånd

Läkaren har rekommenderat att du ska få injektioner av denosumab för att förhindra de skelettkomplikationer (t.ex. frakturer) som kan orsakas av skelettmetastaser eller skelettcancer.

En biverkning som kallas osteonekros i käken (ONJ, skelettskador i käken) har rapporterats som vanligt förekommande (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) hos patienter som får denosumab-injektioner mot cancerrelaterade tillstånd.
ONJ kan också uppträda då behandlingen är avslutad.

✅ Före behandlingsstarten

- Fråga läkaren om han eller hon rekommenderar en tandläkarundersökning innan du startar med denosumabbehandlingen.
- Tala om för läkaren/sköterskan (hälso- och sjukvårdspersonal) om du har några mun- eller tandrelaterade problem.

Patienter som genomgår en tandoperation (t.ex. tandutdragningar), som inte går på regelbundna tandläkarbesök, har en tandköttssjukdom, är rökare eller som genomgår olika typer av cancerbehandlingar kan löpa högre risk för att drabbas av ONJ.

🦷 Under behandlingen

- Du ska hålla god munhygien och gå på regelbundna tandläkarbesök.
- Om du använder tandproteser ska du se till att de sitter bra.
- Om du genomgår tandläkarbehandling eller ska genomgå en tandoperation (t.ex. tandutdragningar), ska du informera läkaren och tala om för tandläkaren att du behandlas med Zadenvi.
- Kontakta omedelbart din läkare och tandläkare om du upplever:
    - lösa tänder
    - smärta eller svullnad i munnen
    - sår som inte läker
    - sår som utsöndrar vätska

Detta kan vara tecken på ONJ.

📄 Läs bipacksedeln

Läs bipacksedeln som följer med läkemedlet för att få mer information.

🗣️ Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln som medföljer förpackningen. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket via:

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.