Version 1

Patientens navn:_____

Adress:_____

Födelsedatum:_____Vikt:_____

I akuta situationer, vänligen kontakta:

Läkarens namn:_____

Läkarens telefonnummer:_____

Läkarens stämpel:

RIVAROXABAN ZENTIVA PATIENTKORT

- Bär alltid detta kort med dig
- Tag fram kortet varje gång du söker behandling hos läkare eller tandläkare

Eventuella biverkningar rapporteras till PV-Sweden@zentiva.com.

Vad bör jag veta om Rivaroxaban Zentiva?

- Rivaroxaban Zentiva gör blodet tunnare, vilket förhindrar bildning av farliga blodproppar.
- Rivaroxaban Zentiva måste tas exakt så som din läkare ordinerat. För att få ett optimalt skydd mot blodproppar **ska du aldrig hoppa över en dos**.
- Du ska inte sluta ta Rivaroxaban Zentiva utan att först tala med din läkare, eftersom risken för blodproppar kan öka.
- Tala om för din vårdpersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkes ta andra läkemedel, innan du påbörjar behandling med Rivaroxaban Zentiva.
- Tala om för din vårdpersonal att du tar Rivaroxaban Zentiva innan kirurgi eller andra ingrepp.

När ska jag be om råd från min läkare?

När man tar blodförtunnande medel som Rivaroxaban Zentiva är det viktigt att känna till eventuella biverkningar. Blödningar är den vanligaste biverkningen. Påbörja inte behandling med Rivaroxaban Zentiva om du vet att du har risk för blödningar, utan att först diskutera detta med din läkare. Tala genast om för din läkare om du har fått några tecken eller symptom på blödning enligt nedan:

- Smärta
- Svullnad eller obehag
- Huvudvärk, yrsel eller svaghet
- Ovanligt många blåmärkan, näsblödning, blödningar från tandköttet eller frånsår som tar lång tid att sluta blöda
- Menstruation eller vaginal blödning som är kraftigare än normalt
- Blod i urinen som kan vara rosa- eller brunfärgad, röd, eller svart avföring
- Upphostningar med blod, eller kräkningar med blod eller kaffesumpsliknande kräkningar.

Hur ska jag ta Rivaroxaban Zentiva?

For att få ett optimalt skydd, ska Rivaroxaban Zentiva

- 2,5 mg tas med eller utan mat
- 10 mg tas med eller utan mat
- 15 mg tas med mat
- 20 mg tas med mat

Information för vårdpersonal:

INR-test ska inte användas eftersom det inte är ett tillförlitligt mått på den antikoagulatoriska aktiviteten hos Rivaroxaban Zentiva.